



Les injections intracaverneuses

51.088F

Centre hospitalier Jan Yperman
Briekestraat 12, 8900 Ieper/Ypres
info@yperman.net • 057 35 35 35
www.yperman.net •     

BROCHURE D'INFORMATION

Les injections intracaverneuses

Cher patient,

Dans cette brochure, vous trouverez davantage d'informations au sujet des injections intracaverneuses.

Avez-vous encore des questions après avoir lu cette brochure ? N'hésitez pas à les poser. Votre médecin traitant et le personnel infirmier sont à votre disposition.

En quoi consistent les injections intracaverneuses ?

Il s'agit d'injections pratiquées dans les corps caverneux du pénis. Lors d'une érection, l'apport de sang vers les corps caverneux (2 réservoirs situés latéralement dans le pénis) augmente, de sorte que le pénis devient dur. Toutefois, en cas de troubles de l'érection, cette fonction est altérée.

On injecte une substance qui dilate les vaisseaux à la base du pénis, à l'aide d'une très fine aiguille. Cette substance ouvre les petites artères au maximum, afin que le pénis reçoive un maximum de sang. Ceci donne lieu à une érection de bonne qualité.

Ce traitement est-il adapté pour moi ?

Ce traitement est proposé lorsque les médicaments ne sont pas assez efficaces ou provoquent trop d'effets indésirables. Le fait qu'il soit question d'une injection suscite souvent une certaine réticence, et il va de soi que c'est compréhensible. Toutefois, l'expérience nous a appris que le degré de satisfaction par rapport à ce traitement est très élevé.

Pourquoi la première injection est-elle administrée en consultation ?

Il y a 2 raisons à ceci. Premièrement, tout le monde n'a pas besoin de la même dose. Si l'érection n'est pas assez puissante après une première injection, la dose devra être adaptée. Il faudra alors chercher la dose adéquate pour vous.

Deuxièmement, l'injection requiert une certaine technique, que nous vous apprenons lors de la consultation.

Quels sont les effets indésirables ?


En général, nous constatons un haut niveau de satisfaction à l'égard de ce traitement. Les effets indésirables sont exceptionnels. Avec un peu d'habitude, l'injection est pratiquement indolore. Si l'injection n'est pas réalisée avec la propreté nécessaire, il y a un faible risque d'infection.

En cas d'utilisation prolongée, on peut voir apparaître du tissu cicatriciel, qui semble dur au toucher. Pour éviter ceci, on conseille de changer régulièrement de site d'injection.

Un effet indésirable grave est l'apparition d'une érection qui dure plus de 4 heures (priapisme). Dans ce cas, vous devez vous rendre aux Urgences. Toutefois, ceci est devenu extrêmement rare en raison de l'augmentation progressive de la dose.

Comment dois-je m'injecter le produit ?

- Choisissez tout d'abord le site d'injection. Pour ce faire, tenez votre pénis à l'horizontale, avec votre main non dominante. Choisissez un endroit à peu près à mi-distance ou un peu plus vers vous. Veillez à rester loin du gland.
- Les corps caverneux sont situés sur le côté. Ne piquez donc, ni au-dessus, ni en dessous. Le meilleur endroit est en oblique, au-dessus. Piquez toujours selon un angle de 90 degrés, donc perpendiculairement par rapport au pénis.
- Ensuite, désinfectez la peau du pénis à l'endroit où vous allez piquer. Introduisez l'aiguille en totalité, jusqu'à la base. N'ayez pas peur, elle est courte et très fine. Injectez lentement la dose prescrite et enlevez l'aiguille à la fin de l'injection.
- Appuyez pendant 1 minute sur le site d'injection, afin d'éviter un éventuel hématome (« bleu »). Vous obtiendrez une érection au bout de 5 à 10 minutes.



Centre hospitalier Jan Yperman

Briekestraat 12, 8900 Ieper/Ypres • info@yperman.net • 057 35 35 35



www.yperman.net